

Servizio Epidemiologia e Prevenzione

Prot. n. 95990/DP

San Gregorio di Catania 23 SET.2016

Responsabili distrettuali
UU.OO. igiene Pubblica

Responsabile U.O.
Ambulatori Catania

Responsabile C.V.I.

Oggetto: Disposizioni per la somministrazione della vaccinazione antimeningococcica

A seguito di due casi di meningite meningococcica - uno di gruppo B e l'altro di gruppo C - verificatesi a Palermo, in soggetti di giovane età (22 e 23 anni), l'Assessorato regionale della Salute ha emanato la nota circolare prot. n.62169 del 21.07.2016 "Emergenza meningite meningococcica. Integrazione offerta vaccino antimeningococcico coniugato tetravalente". Essa dispone che, a tutti i giovani di età compresa tra 12 e 30 anni residenti in Sicilia che richiedono la vaccinazione antimeningococcica, venga offerto gratuitamente, fino a nuova disposizione, il vaccino antimeningococco tetravalente (A,C,W135,Y) coniugato, denominato "NIMENRIX", prodotto dalla Pfizer.

La problematica della meningite trova particolare attenzione da parte dei cittadini a causa della rilevante letalità ad essa associata. Vengono, quindi, spesso posti quesiti ai quali è opportuno fornire risposte quanto più possibile certe e tali da evitare un eccesso di allarmismo. Di seguito riteniamo utile riportare quelli che riteniamo essere i più frequenti quesiti con le relative risposte.

- a) Per i vaccinati fra il 2° ed il 7° anno di vita - con vaccino antimeningococco coniugato C o con vaccino antimeningococco tetravalente coniugato - è indicato un richiamo? **SI**
A che distanza dalla prima dose?
Non prima di 3 anni, considerando che la copertura stimata della prima dose è di circa 5 anni.
E' opportuno un richiamo con il tetravalente? **SI**
- b) Per i vaccinati dopo il 7° anno di vita - con vaccino antimeningococco coniugato C o con vaccino antimeningococco tetravalente coniugato - è indicato un richiamo? **SI**
A che distanza dalla prima dose?
Non prima di 5 anni, considerando che la copertura stimata della prima dose in questa fascia d'età è di circa 7 anni.
E' opportuno un richiamo con il tetravalente? **SI**
- c) Per coloro i quali siano stati già vaccinati con due o più dosi di vaccino antimeningococco coniugato C, a qualsiasi età, è indicato un richiamo con il tetravalente? **SI**

A quale distanza dall'ultima dose?
Almeno 3 anni.

- d) La dose di richiamo del vaccino tetravalente è in regime di copayment ?
SI, per i soggetti **fino al compimento dell'11° anno e dopo il 31° anno.**
Per i soggetti a rischio è sempre gratuito prescindendo dall'età.
- e) L'offerta del vaccino antimeningococco B, denominato BEXSERO, prodotto dalla GSK, è limitata solo ai nati dal 01.01.2015 in poi? **NO**
Quali altri soggetti possono praticare la vaccinazione con BEXSERO?
- **Gratuitamente, soggetti a rischio nati precedentemente al 2015.**
- **In copayment (costo 55+15€ per singola dose) per soggetti non a rischio nati precedentemente al 2015.**
- f) Il vaccino BEXSERO può essere cosomministrato con altri vaccini? **Attualmente NO**

La presente nota andrà trasmessa a tutto il Personale impegnato nelle attività di vaccinazione. Inoltre, sarà cura dei responsabili distrettuali trasmettere la presente nota, preferibilmente con posta elettronica, ai PLS operanti nei territori di rispettiva competenza

IL DIRETTORE
SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA
(Dott. Cuccia Mario)

